

**La Pudibonde, *Calliteara pudibunda* (LINNAEUS, 1758)**  
Lepidoptera, Erebidae, Lymantriinae

par Bernard SCHMELTZ



La chenille (photo ci-contre), a tissé son cocon le 5 octobre 2012, et s'est nymphosée deux jours plus tard.

Très polyphage, cette espèce se nourrit d'août à octobre sur de nombreuses essences feuillues, y compris les arbres fruitiers. [ORHANT, 2011]



Le papillon s'est métamorphosé le 12 mai 2013. Il s'agit ici d'un exemplaire femelle.

L'espèce vole de fin avril à juin [ORHANT, 2011], de mai à juin selon ROBINEAU, [2011]

Son autre nom vernaculaire, "La patte étendue", lui vient de sa posture au repos : ses deux pattes antérieures sont étirées vers l'avant (photo ci-contre).

**Bibliographie**

ORHANT G, 2011 - Atlas des papillons de nuit du Nord-Pas-de-Calais. Lépidoptères Macrohétérocères. 484 p., ill., Phot. Coul. S. WAMBEKE, cartes. **G.D.E.A.M. 62.**

ROBINEAU R., (Coordinateur), 2011 - Guide des papillons nocturnes de France Plus de 1620 espèces décrites et illustrées- **Delachaux et Niestlé** : 287 pp.