Thanasimus formicarius (LINNAEUS, 1758), le Cléron des fourmis (Coleoptera, Cleridae)

par Bernard SCHMELTZ

Prédateur entre autres de scolytes, ce coléoptère (7à 10 mm)[LOHSE, 1979] peut se rencontrer même en hiver, en cas de redoux, en plaine et au moins jusqu'à 900 mètres d'altitude en Alsace [CALLOT,2011].

Bibliographie

CALLOT H., 2011 - Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace -Tome 18 - Scirtidae Cantharidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae, Dermestidae, Anobiidae, Byrrhidae, Eucinetidae, Clambidae, Dascillidae, Drilidae, Lycidae, Homalisidae, Lampyridae, Lymexylidae, Trogossitidae, Derodontidae, Nosodendridae, Bostrichidae, Dryopidae, Elmidae, Heteroceridae, Limnichidae – ***Société Alsacienne d'Entomologie* -** Musée Zoologique de l'Université et de la Ville de Strasbourg **:** 125 pages, 289 cartes.

LOHSE G.A., 1979 – Familie : Cleridae - dans " Die Käfer Mitteleuropas" - FREUDE H., HARDE K.W. & LOHSE G.A. - Band 6 - **Goecke & Evers Verlag, Krefeld :** 367 pp.