

Quelques papillons du liseron

par Bernard SCHMELTZ



Photo 1 : Le Ptérophore blanc



Photo 2 : Le Ptérophore commun



Photo 3 : La Pie



Photo 4 : Chenilles du Sphinx du liseron

Les liserons, comme le Liseron des haies, *Calystegia sepium* (L.) R.Br., 1810, bien que haïs par certains jardiniers, ont leur utilité : joliment décoratifs, ils portent des fleurs qui offrent nectar et pollen en quantité aux abeilles. Ils servent aussi de nourriture aux chenilles de plusieurs espèces de papillons.

Le Ptérophore blanc (photo 1), *Pterophorus pentadactyla* (LINNAEUS, 1758), ou "Petit ange de nuit", est actif la nuit et peut être attiré par les lumières [WIKIPÉDIA, 2012 a].

Le Ptérophore commun (photo 2), *Emmelina monodactyla* (LINNAEUS, 1758), vole presque toute l'année. Ses chenilles se développent également sur des Ipomées et des Chénopodiacées. [UKMOTHS, 2012]

(L'un des plus petits papillons d'Europe, **la Nepticule du liseron** (*Stigmella freyella* (HEYDEN, 1858), Winden-Zwergminierfalter en allemand), ne mesure qu'un peu plus de 3 mm d'envergure. Sa chenille vit en mineuse à l'intérieur des feuilles du liseron qu'elle ronge [LERAUT, 2012].)

La Pie*, (photo 3) *Aedia funesta* (ESPER, 1786) fait partie de la famille des Noctuelles (Noctuidae). Le papillon butine les fleurs la nuit ; sa chenille se développe exclusivement sur les liserons, se nourrit la nuit et se cache au sol durant la journée. Les adultes volent de mai à juillet, l'espèce peut présenter une deuxième génération partielle (VIII-IX) [WIKIPÉDIA, 2012 b], [ROBINEAU, 2012].

Le Sphinx du liseron, *Agrius convolvuli* (LINNAEUS, 1758) est l'un des papillons au vol le plus rapide : certains sphinx atteignent, semble-t-il, une "vitesse de 120 km/h par conditions idéales" [GROUPE DE TRAVAIL DES LÉPIDOPTÉRISTES, 1999]. Ses chenilles (photo 4), d'une taille de 10 à 12 cm au dernier stade, se nourrissent également sur l'oseille, l'impatiente, les marguerites, le tournesol [GROUPE DE TRAVAIL DES LÉPIDOPTÉRISTES, 1999].

(Les papillons des photos 1 à 3 ont été photographiés à SOPPE-le-HAUT)

* Une espèce proche, **La Funèbre** - ou Noctuelle en deuil, *Tyta luctuosa*, se développe aussi sur les liserons.

Bibliographie et sites consultés

GROUPE DE TRAVAIL DES LÉPIDOPTÉRISTES, 1999 - Les papillons et leur biotope, Volume 2 - **Éditions Pro Natura - Ligue Suisse pour la protection de la nature** : 667 pp.

LERAUT P., 2012 - Où les papillons passent-ils l'hiver ? - 100 clés pour comprendre les papillons - **Éditions Quae** : 143 pp.

ROBINEAU R., 2012 - Guide des papillons nocturnes de France - **Delachaux et Niestlé** : 287 pp.

UKMOTHS, 2012 - 1524 *Emmelina monodactyla* LINNAEUS, 1758 - <http://ukmoths.org.uk/show.php?bf=1524> (Page consultée le 05-XII-12).

WIKIPÉDIA, 2012 a - http://fr.wikipedia.org/wiki/Pterophorus_pentadactyla (Page consultée le 04-XII-12).

WIKIPÉDIA, 2012 b - <http://de.wikipedia.org/wiki/Zaunwinden-Trauererle> (Page consultée le 04-XII-12).

(Bernard SCHMELTZ (Société entomologique de Mulhouse)
15 Grand'rue F-68780 SOPPE-le-HAUT)

Cet article est paru dans le Bulletin Municipal de Soppe-le-Haut (68) "*L'ÉCHO DU SOULTZBACH*" N° 48, Décembre 2013.)

Citation recommandée : SCHMELTZ B., 2013 - Quelques papillons du liseron- [site de la SEM](#) (Page consultée le (date))